

א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים
ב. בגרות לבנינים אקסטרניים
מועד הבחינה: תשע"ט, מאי 2015
מספר השאלה: 305, 035005
דף נסחאות ל-4 ו-5 יחידות לימוד
(נספח):

ה בוחן ייקח

שאלון ח'

הוראות לפתרון

א. משך הבחינה: שעתיים.

ב. מבנה השאלה וMETHOD העריכה: בשאלון זה שני פרקים.

פרק ראשון - אלגברה $33\frac{1}{3} \times 1 = 33\frac{1}{3}$ נקודות

פרק שני - הנדסת המישור והסתברות $33\frac{1}{3} \times 2 = 66\frac{2}{3}$ נקודות

סה"כ - 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

(1) מחשבון לא גրפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitinן לתכנות.
שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.

(2) דפי נסחאות (מצורפים).

הוראות מיוחדות:

(1) אל תעתיק את השאלה; סמן את מספורה בלבד.

(2) התחיל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במתכברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעוזרת מחשבון.

הסביר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

(3) לטיוויה יש להשתמש במתכברת הבחינה או בדף שקיבלת מהמשגיחים.
שימוש בטיוויה אחרה עלול לגרום לפסילת הבחינה.

ההנחיות בשאלון זה מנוטות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחניות אחד.

ב. תצלוח

/המשך מעבר לדף/

השאלות

שים לב! הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון – אלגברה ($\frac{1}{3}$ נקודות)

ענה על אתם מהשאלות 1-2.

שים לב! אם תענה על יותר שאלה אחת, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.

אלגברה

$$(a+3)^2x + (a-3)y = 18 - 4a^2$$

$$(a+3)^2x - (a-3)y = 2a^2$$

a הוא פרמטר.

א. (1) הביע את פתרון המערכת באמצעות a עבור $a \neq \pm 3$.

מצא עבור איזה ערך של a :

(2) אין פתרון למערכת. נמק.

(3) יש אין-סוף פתרונות למערכת. נמק.

ב. מצא את הערך של a שעבורו הפתרון היחיד של המערכת מקיים $3 = xy$.

2.

נתונה סדרה: a_1, a_2, \dots, a_{2n}

האיבר הנמצא במקום ה- n בסדרה מקיים $a_n = 6n + 9$

א. הוכיח כי הסדרה היא סדרה חשבונית.

ב. נתון כי סכום n האיברים בסדרה גדול פי 1.92 מסכום האיברים הנמצאים
במקומות הזוגיים.

מצא את n.

ג. חמשlico את הסדרה הנתונה עד a_{4n} . בסדרה של 4 האיברים מחקו את כל
האיברים שמספר המיקום שלהם מתחלק ב- 4,


כלומר האיברים ... a_4, a_8, a_{12}, \dots

מצא את סכום האיברים שנותרו בסדרה של 4 האיברים.

/המשך בעמוד 3/

פרק שני – הנדסת המישור והסתברות ($\frac{2}{3}$ נקודות)ענה על שתיים מהשאלות 3-6, מהן מותר לענות כל היותר על אחת מהשאלות 5-6.(לכל שאלה – $\frac{1}{3}$ נקודות)

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, יבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.
בשאלות בהנדסת המישור יש להשתמש בשיטות של הנדסה בלבד.

הנדסת המישור


3. AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.
BC ו- AE הם מיתרים במעגל זה.
מנקודה C העבירו אנך למיתר AE
האנך חותך את המשך של AE בנקודה F
(ראה ציור).

- נתון כי $\angle CEF = \alpha$
א. הוכח כי $\angle AOC = 2\alpha$.
ב. $\triangle EFC \sim \triangle BCA$.
ג. נתון גם: $OE = 2$, $BC = BO$, $EF = 2$ ס"מ
חשב את האורך של CF.

4. במרובע ABCD נקודה E נמצאת על האלכסון AC.

דרך נקודה E מעבירים שני ישרים:

ישר המקביל לצלע BC וחותך את AB בנקודה F
וישר המקביל לצלע AD וחותך את DC בנקודה G
(ראה ציור).



א. (1) הוכח כי $\frac{EF}{BC} = \frac{AE}{AC}$

(2) הוכח כי $\frac{EF}{BC} + \frac{EG}{AD} = 1$

ב. נתון: $\frac{EF}{BC} = \frac{2}{5}$

(1) מצא את היחס $\frac{GC}{DG}$

(2) מהו היחס בין שטח המשולש AGC לשטח המשולש ADG? נמק.

שים לבן מותר לענות בלילה על אחת מהשאלות 5-6.
נושאות בהסתברות מותנית נמצאות בעמוד 6.

הסתברות

5. נתונות שלוש קופסאות.

בקופסה אחת יש שני מטבעות זהב, בקופסה אחת יש מטבע זהב ומטבע כסף,
ובקופסה אחת יש שני מטבעות כסף.

א. בוחרים באקראי קופסה, ומוציאים ממנה באקראי מטבע אחד.

(1) מהי ההסתברות שמוסיאים מטבע זהב?

(2) ידוע שהזוא מטבע זהב.

מהי ההסתברות שהמטבע שנשאר בקופסה הוא מטבע זהב?

ב. מחזירים את המטבע שנבחר לkopfsha שלו,שוב בוחרים באקראי קופסה, ומוציאים
ממנה באקראי מטבע אחד.

מהי ההסתברות שהמטבע שנשאר בקופסה הוא מטבע זהב?

ג. האם המאורע שבתת-סעיף א (1) והמאורע שבסעיף ב הם מאורעות בלתי תלויים?

נק.

/המשך בעמוד 5/

שיעור השטברותית בחגי יומדיום

6. בבית ספר מסוים אספו נתונים על הצלחה בבחינות של התלמידים המתכוונים לבחינות ושל התלמידים שלא מתכוונים לבחינות. סידרו את הנתונים בטבלה הprofessoriet שפניך.

	נכשלים בבחינות	מצליחים בבחינות	
0.95	0.04	0.91	מתכוונים לבחינות
0.05	0.02	0.03	לא מתכוונים לבחינות
	0.06	0.94	

תלמיד שבודק את הנתונים, חישב את שיעור התלמידים שלא מתכוונים לבחינות מבין הנכשלים בבחינות, ואת שיעור התלמידים שמתכוונים לבחינות מבין הנכשלים בבחינות. על סמך חישובים אלה הוא כתוב בעיתון בית הספר כתבה שכותרת: "כאשר לא מתכוונים לבחינות מקטינים את הסיכוי לכישلون בבחינה".

הנהלת בית הספר בדקה את הנתונים וטענה כי הចוטרת בעיתון אינה נכונה.

א. קבע איזו טענה נכונה – זו שבכותרת העיתון או זו של הנהלה. נמק.

הראה את החישובים של התלמיד ואת החישובים של הנהלה.

ב. בבית הספר יש 24 תלמידים שמתכוונים לבחינות אך אינם מצליחים בהן. כמה תלמידים בבית הספר מתכוונים לבחינות ומצליחים בהן?

/המשך בעמוד 6/

נשיאות בהסתברות מותנית

$$P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

פוקטורציה מותנית והסתברות מותנית:

$$P(A / B) = \frac{P(B / A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

נוסחת בייס:

$$P(A / B) \neq P(A / \bar{B})$$

יש קשר סטטיסטי:

$$P(A / B) \neq P(A)$$

בצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך